

◆ 薬価基準収載医薬品 (2023.8.9) - 新医薬品 -

【1成分2品目】

内用薬

収載日	薬効分類名	商品名	規格単位	薬価(円)	会社名	成分名	効能・効果	用法・用量	備考 ([作用機序]、[承認条件]等)
8/9	抗ウイルス化学療法剤 (HIVカプシド阻害剤)	シュレンカ錠300mg	300mg 1錠	94,814.20	製造販売元／ ギリアド・サイエン シズ	レナカパビルナトリ ウム	多剤耐性HIV-1 感染症	通常、成人には投与1日目及び2日目に2錠 (レナカパビルとして600mg) を、8日目に1錠 (レナカパビルとして300mg) を1日1回経口投与する。本剤は、食事の有無にかかわらず投与できる。投与に際しては、必ず他の抗HIV薬と併用すること。	希少疾病用医薬品 (ピーク時の予測投与患者数:7人)。 [作用機序] 本剤は、HIV-1のカプシドタンパク単量体間の界面に直接結合しHIV-1プロウイルスDNAのカプシド介在性核内取込み、ウイルスの形成及び放出並びにカプシドコア形成等のウイルス複製における複数の重要な段階に関与するHIV-1カプシドタンパクの機能を阻害することにより、HIV-1の複製を阻害する。  [承認条件] (抜粋) ・本剤の使用に当たっては、有効性・安全性のデータを引き続き収集中であること等を十分に説明し、インフォームドコンセントを得るよう、医師に要請すること。 ・全症例対象の使用成績調査の実施。

注射薬

収載日	薬効分類名	商品名	規格単位	薬価(円)	会社名	成分名	効能・効果	用法・用量	備考 ([作用機序]、[承認条件]等)
8/9	抗ウイルス化学療法剤 (HIVカプシド阻害剤)	シュレンカ皮下注 463.5mg	1.5mL 2瓶1組	3,208,604	製造販売元／ ギリアド・サイエン シズ	レナカパビルナトリ ウム	多剤耐性HIV-1 感染症	通常、成人にはレナカパビル経口剤の投与開始後15日目に、レナカパビルとして927mgを皮下投与する。以降は、927mgを6か月に1回、皮下投与する。投与に際しては、必ず他の抗HIV薬と併用すること。	希少疾病用医薬品 (ピーク時の予測投与患者数:70人)。 [作用機序] 本剤は、HIV-1のカプシドタンパク単量体間の界面に直接結合しHIV-1プロウイルスDNAのカプシド介在性核内取込み、ウイルスの形成及び放出並びにカプシドコア形成等のウイルス複製における複数の重要な段階に関与するHIV-1カプシドタンパクの機能を阻害することにより、HIV-1の複製を阻害する。  [承認条件] (抜粋) ・本剤の使用に当たっては、有効性・安全性のデータを引き続き収集中であること等を十分に説明し、インフォームドコンセントを得るよう、医師に要請すること。 ・全症例対象の使用成績調査の実施。

※各製品についての詳細な情報や正確な情報は、当該製品添付文書や官報等をご参照下さい。